





| COLOR | SIMBOLO                 | ESPECIES DOMINANTES                                                                                                          | ÁREA (ha) | PORCENTAJE |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|       | Baa1/Pin-Osp-Psp        | <i>Prunus integrifolia</i> , <i>Ocotea spp.</i> Y <i>Persea spp.</i>                                                         | 831.01    | 2.85%      |
|       | Baa1/Hfe-Bgl            | <i>Hesperomeles ferruginea</i> y <i>Bejaria glauca</i> .                                                                     | 125.25    | 0.43%      |
|       | Vp-Rfb/Epe-Ale          | <i>Espeletia perijaensis</i> y <i>Altenstenia leucantha</i> .                                                                | 268.49    | 0.92%      |
|       | Vp-P-Ch/Cin-Cte         | <i>Calamagrostis intermedia</i> y <i>Chusquea tessellata</i> .                                                               | 504.45    | 1.73%      |
|       | Vp-Rfa/Ldi              |                                                                                                                              | 1197.92   | 4.11%      |
|       | Baa1/Wpi-Cmu-Pmo-Rro    | <i>Weinmania pinnata</i> , <i>Clusia multiflora</i> , <i>Prumnopitys montana</i> y <i>Retrophyllum rospiglosi</i> .          | 5612.07   | 19.26%     |
|       | Vp-Mb-Rfb-P/Lst-Epe-Cin | <i>Lourtegia stoechadifolia</i> , <i>Hypericum phellos</i> , <i>Calamagrostis intermedia</i> y <i>Calamagrostis effusa</i> . | 1355.45   | 4.65%      |
|       | Baa1/Wpi-Bin-Rro        | <i>Weinmannia pinnata</i> , <i>Brunellia integrifolia</i> y <i>Roupala pseudocordata</i> .                                   | 2403.03   | 8.25%      |
|       | Baa1/Cmu-Wpi-Pmo        | <i>Clusia multiflora</i> , <i>Weinmannia pinnata</i> y <i>Prumnopitys montana</i> .                                          | 8257.86   | 28.34%     |
|       | Baa1/Hfe-Pmo            | <i>Hesperomeles ferruginea</i> y <i>Prumnopitys montana</i> .                                                                | 5707.09   | 19.59%     |
|       | Ma/Gpu-Bgl              | <i>Gaiadendron punctatum</i> y <i>Bejaria glauca</i> .                                                                       | 2314.67   | 7.94%      |
|       | Vp-Mb/Hju-Ani-Bgl       | <i>Hypericum juniperinum</i> , <i>Arcytophyllum nitidum</i> y <i>Bejaria glauca</i> .                                        | 561.71    | 1.93%      |
| TOTAL |                         |                                                                                                                              | 29139.01  | 100.00%    |



ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL PÁRAMO Y ZONIFICACIÓN, PARA LA PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PÁRAMOS DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ



Mapa: 05

VEGETACIÓN POTENCIAL

Fuente:  
Generación y proceso cartográfico Henry Arellano P.  
Revisión y edición de información J. orlando Rangel Ch. & Henry Arellano P.  
Montaje e impresión INSAT LTDA.  
Cartografía base IGAC Escala 1:25.000